PENGARUH CRYOTHERAPY DAN ORALCARE STANDAR YANG DIGUNAKAN RS TERHADAP DERAJAT ORAL MUCOSITIS PADA ANAK LEUKEMIA

THE INFLUENCE OF CRYOTHERAPY AND ORALCARE STANDARD USED BY THE HOSPITAL TO THE DEGREE OF ORAL MUCOSITIS IN LEUKEMIA CHILDREN

Dina Carolina¹, Nyimas Heny Purwanti², Titi Sulastri³

¹ Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Indonesia

² Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Indonesia

³ Poltekkes Kemenkes III Jakarta, Indonesia

Email: dinakanza.dc@gmail.com

Abstrac : The Influence Of Cryotherapy And Oral careStandard Used by The Hospital To the Degreeof Oral Mucositis In Leukemia Children. Leukemia is the number one most common cancer in children. Management to eradicate leukemia cancer cells one of which is with chemotherapy. Chemotherapy is the administration of a group of drugs that are cytotoxic, whose side effects can cause oral mucositis. Giving cryotherapy is felt necessary to reduce and prevent the degree of oral mucositis in children. Cryotherapy is the administration of ice chips before, shortly and after chemotherapy for about 70 minutes. This research was conducted to see the effect of cryotherapy and standard oral care on the degree of oral mucositis. This study uses Quasi experimental with a non equivalent control group design before after design. The sampling technique used was purposive sampling with 74 respondents. Tests conducted were paired t tests and independent t tests. The results showed that there was an effect of the administration of cryotherapy and oral care standard hospitaly on the intervention and control groups with ($p = 0,000$). Cryotherapy can be used as one of the atraumatic care interventions of children during chemotherapy. **Keywords:** Leukemia, Oral mucostis, Cryotherapy + oral care

Abstrak : Pengaruh Cryotherapy dan Oralcare Standar yang digunakan Rs Terhadap Derajat Oral mucositis pada anak dengan Leukemia.

Leukemia merupakan urutan kanker nomer satu yang banyak ditemui pada anak. Penatalaksanaan untuk memberantas sel kanker leukemia salah satunya adalah dengan kemoterapi. Kemoterapi merupakan pemberian segolongan obat-obatan yang bersifat sitotoksik, yang efek sampingnya dapat menyebabkan *oral mucositis*. Pemberian *cryotherapy* dirasakan perlu untuk menurunkan dan mencegah derajat *oral mucositis* pada anak. *Cryotherapy* adalah pemberian es keping sebelum, sesaat dan setelah dilakukan kemoterapi selama kurang lebih 70 menit. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh *cryotherapy* dan *oral care* standar terhadap derajat *oral mucositis*. Penelitian ini menggunakan *Quasi experimen* dengan rancangan *non equivalent control group before after design*. Tehnik sampling yang digunakan adalah *purposive* sampling dengan 74 responden. Uji yang dilakukan adalah uji *t paired* dan *independent t* tes. Hasil menunjukkan adanya pengaruh pemberian *cryotherapy* dan *oral care* standar RS terhadap kelompok intervensi dan kontrol dengan ($p=0,000$). *Cryotherapy* dapat dijadikan sebagai salah satu intervensi atraumatic care anak selama menjalani kemoterapi. **Kata Kunci :** Leukemia, *Oral mucostis*, *Cryotherapy+oral care*

PENDAHULUAN

Kasus kanker pada anak telah meningkat sekitar 13% secara global dalam dua dekade terakhir. Setiap tahun terdapat 18,1 juta kasus baru anak di dunia terdiagnosis kanker, dan diperkirakan 9,6 juta diantaranya meninggal dunia. Angka kematian kanker pada anak

mencapai 50-60% karena umumnya penderita datang terlambat atau sudah dalam keadaan stadium lanjut akibat gejala kanker yang sulit di deteksi terlebih pada anak-anak (WHO, 2018).

Di negara berkembang yang berpenghasilan rendah dan menengah, menurut *Union for International Cancer Control* (UICC) menyatakan setiap tahunnya terdapat sekitar

176.000 anak yang terdiagnosis kanker. Sementara itu di Indonesia terdapat sekitar 11.000 penyakit kanker pada anak setiap tahunnya, dan terdapat sekitar 650 kasus kanker anak di Jakarta (Kemenkes RI, 2015). Berdasarkan (Riskesdas, 2013) tercatat jenis kanker yang paling banyak diderita oleh anak di Indonesia yaitu leukemia dan retinablastoma (Kanker bola mata). Leukemia merupakan kanker darah yang paling banyak ditemukan pada kasus anak-anak. leukemia terbagi menjadi dua yaitu leukemia limfoblastik akut (LLA) dan leukemia mielositik akut (*acute myelogenous leukemia* (AML)), Diperkirakan 3-4 kasus dari 100.000 anak mengalami leukemia. Leukemia yang sering terjadi pada anak adalah leukemia limfoblastik akut (LLA) (Hockenberry & Wilson, 2013).

Penanganan kanker pada anak bertujuan agar dapat mengendalikan jumlah dan penyebaran sel-sel kanker, penanganan kanker meliputi kemoterapi, terapi biologi, terapi radiasi, transplatasi sumsum tulang, transplatasi sel darah perifer (*peripheal blood stem cell*), dan *oral cryotherapy*. Kemoterapi adalah pemberian segolongan obat-obatan yang bersifat *sitotoxic* dan kemoterapi merupakan *treatment* primer yang digunakan untuk mengatasi kanker. Terdapat berbagai macam jenis obat kemoterapi yang diberikan dengan suatu protokol tertentu disesuaikan dengan jenis kanker yang dialami oleh anak (Hockenberry dan Wilson, 2013).

Kemoterapi merupakan salah satu terapi yang memperlihatkan efektifitas yang tinggi pada kanker (NCI, 2009). Mekanisme kerja obat kemoterapi yang sangat kuat untuk membunuh sel kanker juga berpengaruh pada sel-sel sehat terutama sel yang pembelahannya bersifat cepat seperti sel folikel rambut, sum-sum tulang belakang, kulit, dan mukosa. Sehingga obat kemoterapi akan menimbulkan beberapa efek samping pada anak diantaranya adalah terjadinya *oral mukositis*, yang dapat menyebabkan anak mengalami kurang nafsu makan. Bila gangguan ini tidak ditangani lebih lanjut maka akan terjadi resiko tinggi pemenuhan nutrisi pada anak yang nantinya akan menjadi penurunan kualitas hidup anak penderita kanker (Gibson & Soanes, 2008).

Di RS banyak anak menolak untuk diberikan *Chlorhexidine* 0,2% dan *nystatin* karena rasanya yang kurang enak. Perawat juga kesulitan memberikan *Chlorhexidine* 0,2%, *NaCl* 0,9% atau *iodine* pada anak yang berusia dibawah tiga tahun karena sifatnya yang tidak boleh tertelan. Peneliti sampai saat ini terus mencari beberapa alternatif obat dalam menangani *oral mucositis* yang murah, efektif, bahan mudah didapat dan mudah diberikan pada anak. Menurut laporan dari

pedoman ESMO working group, *oral cryotherapy* 30 menit dianjurkan untuk pencegahan *oral mucositis* pada pasien yang menerima bolus 5 kemoterapi FU (II, A) dan 20-30 menit *oral cryotherapy* disarankan untuk mengurangi *oral mucositis* pasien yang diobati dengan dosis bolus *edatrexate* (IV, B) (Hedryani, 2012). Menurut *Cancer Care Nova Stovia*, (2008) *Oral Cryotherapy* merupakan pemberian Es pada pasien anak yang mengalami *Oralmucositis* sebelum di lakukan kemoterapi selama 5 mnt, sewaktu kemoterapi selama 30 mnt, dan setelah kemoterapi selama 35 mnt.

METODE

Desain penelitian menggunakan *Quasi Experimental* dengan pendekatan *nonequivalent control group before after design* yaitu penelitian yang memberikan perlakuan atau eksperimen pada dua atau lebih grup, grup tersebut akan diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan (Darma, 2015). Penelitian ini menggunakan *nonequivalent control group* dengan sampel 74 responden yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok intervensi 37 responden dan control 37 responden. Instrumen yang di gunakan menggunakan OAG sebanyak 8 pertanyaan dan lembar Observasi. Instrumen pada penelitian ini memiliki nilai validitas dari tiap soal kuesioner memiliki nilai koefisien validitas lebih dari r tabel dan reabilitas 0,910 lebih dari r tabel 0,444 kemudian penelitian ini telah dinyatakan lolos kaji etik berdasarkan surat no. 079/KEKP/V/2019 setelah dinyatakan valid peneliti melakukan pengukuran derajat *oral mucositis* sebelum di lakukan implementasi pemberian *cryotherapy* dan *oral care* standar RS dan mengukur kembali setelah di berikan implementasi, hal tersebut dilakukan selama 3 hari dan dimonitoring derajat *oral mucositis*nya. Dan untuk kelompok control pemberian hanya diberikan *oral care* standar RS yaitu menggunakan *nicostatin* dan *clorin* atau obat kumur.

HASIL

Hasil penelitian didapatkan data dari distribusi karakteristik responden Usia, Jenis Kelamin, Jenis obat kemoterapi usia secara umum 7-12 tahun intervensi 35(94,6%), kontrol 30(81,1%). Jenis kelamin umumnya laki-laki 21(56,8%) dan 22(59,5%), Jenis obat 24(64,9%) dan 22(59,5%).

Tabel 1: Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Jenis Obat RS Dharmas, Tahun 2019

Variabel	Kelompok	Pengukuran	Mean	Sd	Se	P Value
Pre - Post Test Cryotherapy	Intervensi	Pre	13,78	2,31	0,38	0,001
		Post	11,78	2,61	0,43	
	Kontrol	Pre	13,38	2,73	0,44	0,38
		Post	12,00	2,87	0,47	

Tabel 2: Distribusi derajat oral mucositis anak dengan leukemia yang menjalani kemoterapi sebelum dan sesudah Cryotherapy dan Oral care

Variabel	Kelompok Intervensi i (n=37)		Kelompok Kontrol l (n=37)	
	f	(%)	f	(%)
Usia				
4-6 Tahun	2	5,4	7	18,9
7-12 Tahun	35	94,6	30	81,1
Jenis Kelamin				
1. Laki-Laki	21	56,8	22	59,5
2. Perempuan	16	43,2	15	40,5
Jenis Obat Kemoterapi				
1. Dosis Tinggi MTX	24	64,9	22	59,5
2. Dosis Sedang Vincristin	13	35,1	15	40,5

Uji yang dilakukan adalah *Paired t test* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan derajat *oral mucositis* sebelum dan setelah dilakukan intervensi dan uji *independent* dilakukan untuk mengetahui kelompok manakah yang paling besar penurunan derajat *oral mucositis*. Berdasarkan uji lanjutan antara kelompok intervensi sebelum dan setelah didapatkan hasil umumnya rata-rata derajat *oral mucositis* pada kelompok intervensi sebelum dilakukan perlakuan yaitu 13,78 sedangkan setelah diberikan perlakuan menjadi 11,84.

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata *oral mucositis* setelah dilakukan perlakuan mengalami

penurunan rata-rata 1,94. Pada data rata-rata derajat *oral mucositis* kelompok kontrol sebelum dilakukan perlakuan yaitu 13,38 sedangkan setelah diberikan perlakuan menjadi 12,00. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata *oral mucositis* setelah dilakukan pengukuran mengalami penurunan rata-rata 1,38. Hasil rata-rata derajat *oral mucositis* sebelum dan setelah dilakukan intervensi pada kelompok 1 dan 2 mendapatkan hasil kelompok 1 $\alpha = 0,001$ dan kelompok 2 $\alpha = 0,038$ artinya terdapat penurunan derajat *oral mucositis* yang signifikan di kedua kelompok, walaupun terdapat penurunan dari kedua kelompok namun kelompok intervensi lebih signifikan terlihat mendekati $\alpha = 0,000$. Terlihat dari hasil uji anova untuk pengaruh usia, jenis kelamin dan jenis obat kemoterapi tidak ada pengaruh yang menyebabkan terjadinya *oral mucositis*, dengan hasil $\alpha < 0,05$.

PEMBAHASAN

1. Usia

Menurut Lailatul Fitria, (2018) yang mengemukakan pendapat bahwa anak yang menderita kanker terbanyak pada rentang usia 6-11 tahun yaitu sebesar 67%. Hal ini sesuai dari pendapat Bowden & Greenberg, (2010) yang mengatakan bahwa kanker pada anak biasanya tidak terdeteksi. Kurangnya kesadaran orang tua untuk memeriksakan tanda gejala awal yang timbul dari penyakit anaknya juga termasuk faktor pemberat dari penyakit kanker itu sendiri, sehingga saat ditemukan penyakit tersebut biasanya sudah terlambat atau usia anak sudah besar sehingga prognosis kesembuhan semakin kecil.

Disamping itu salah satu penyebab timbulnya leukemia yang lain adalah faktor genetik. Faktor ini jugalah yang menyebabkan kelainan bawaan sejak lahir juga memperbesar potensi anak untuk menderita leukemia, misalnya pada anak dengan *down syndrome*.

2. Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin yang paling banyak mengalami *oral mucositis* adalah laki-laki yaitu sebanyak 22 anak (59,5%). Penelitian ditunjang dari Mulatsih Sri, 2010 yang mengatakan bahwa persentase pasien laki-laki dan perempuan masing-masing 18 dan 15, karena menurut peneliti insidensi laki-laki lebih banyak dibanding perempuan karena relaps sering menyerang pada susunan sistem saraf dan testis. Prognosis yang buruk pada laki-

laki dibanding perempuan karena pada anak laki-laki lebih sering dijumpai T-ALL angka leukosit tinggi serta lebih sering mengalami *testicular relapse*.

3. Jenis Obat Kemoterapi

Obat MTX ini sangat sering diberikan pada pasien kanker darah dan nasofaring. Anak yang mendapat terapi dengan dosis lebih besar. terhadap pengobatan akan lebih rentan mengalami mukositis. Kemoterapi yang dilakukan dalam waktu yang lama, seperti pada anak yang mengalami relaps terhadap pengobatan juga meningkatkan risiko terjadinya mukositis. Selain itu pasien yang mendapat kombinasi terapi juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami mukositis dibandingkan dengan terapi tunggal (Cheng&Yuen, 2014).

Hal ini sesuai dengan pendapat Cawley & Benson, (2015) Terkait dengan faktor risiko yang berhubungan dengan terapi yang diperoleh, *oral mucositis* dipengaruhi oleh agen kemoterapi, dosis kemoterapi, intensitas pengulangan terapi. Agen kemoterapi yang paling sering terkait dengan mukositis adalah *antimetabolit* yang meliputi *etoposide*, *5 FU*, dan *Methotrexate (MTX)*.

4. Pengaruh *cryotherapy* dan *oral care* standar RS terhadap derajat oral mucositis

Hasil dari penelitian terdapat pengaruh pemberian *cryotherapy* dan *oral care* standar RS, hal ini sesuai dengan pendapat dari Wodzinski, (2016) yang menyatakan bahwa pemberian *cryotherapy* dilakukan sebagai pencegahan terhadap kejadian *mucositis* setelah dilakukan kemoterapi, dari sekian banyak cara pencegahan dan penyembuhan *oral mucositis* hanya pemberian *cryotherapy* yang dinyatakan aman digunakan sehingga banyak organisasi *multinational* memberikan dukungan untuk penggunaan *cryotherapy* sebagai perawatan kanker 2014 oleh *internasional society of oral oncology*.

Tabel.3: Perbedaan Derajat *oral mucositis* sebelum dan sesudah Intervensi berdasarkan Kelompok

Variabel	Perlakuan	Mean	Median	SD	Min-Max	n
Derajat Oral mucositis Intervensi	Pre test	13,78	14,00	2,311	10-18	37
	Post test	11,84	12,00	2,641	9-17	37
Derajat Oral mucositis Kontrol	Pre test	13,38	13,00	2,732	9-18	37
	Post test	12,00	12,00	2,877	9-17	37

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan pada kelompok intervensi nilai probabilitas (*p value*) *t independent* sebesar 0,001 dan kelompok kontrol sebesar 0,038. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *p* lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa pada derajat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan antara derajat *oral mucositis* sebelum dan setelah intervensi pada kelompok intervensi dan kontrol. Hasil Penelitian terlihat bahwa walaupun terdapat sama-sama penurunan pada kelompok intervensi dan kontrol namun penurunan derajat *oral mucositis* setelah di berikan intervensi *cryotherapy* dan *Oral care* standar terlihat lebih signifikan.

Hal ini sesuai dengan jurnal penelitian dari Okamoto koichi, (2019) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang membandingkan group yang tidak diberikan *cryotherapy* (24,1%) dan group yang diberikan *cryotherapy* (71,4%) terhadap keberhasilan dalam menurunkan skala oral mucositis.

Menurut peneliti dengan diberikan *cryotherapy* atau keping es membuat vasokonstriksi pembuluh darah yang mengandung obat kemo ke jaringan mukosa mulut, sehingga efek dari obat kemo yang bersifat toksik dapat di cegah dan juga dapat menurunkan derajat oral mucositis dikarenakan efek dari es dapat mempercepat penyembuhan pada sel mulut.

SIMPULAN

Teori model yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori model dari Kolcaba (Alligod, 2013) yaitu teori “*Comfort*” yang terkenal dengan 3 tahapan keperawatan *relief, ease, dan transcendence*. *Relief* diartikan sebagai keadaan dimana perasaan ketidaknyamanan dapat berkurang, *Ease* diartikan sebagai hilangnya rasa ketidaknyamanan yang spesifik, *Transcendence* didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang dapat kembali pulih dari rasa ketidaknyamanan jika rasa ketidaknyamanan tersebut tidak bisa untuk dihindari.

Aplikasi *comfort theory* dalam penanganan *oral mucositis* akibat pemberian obat kemoterapi pada anak dapat diuraikan bahwa untuk aspek *Health care need* yaitu anak memiliki kebutuhan rasa nyaman dan perhatian selama prosedur kemoterapi, dimana *oral mucositis* akibat efek dari kemoterapi dapat berkurang bahkan mungkin dihilangkan. Aspek *Nursing Intervension* yaitu terapi *oral cryotherapy* dan *oral care* standar untuk memberikan kenyamanan pada anak, dengan tujuan untuk mengurangi dan menghilangkan derajat *oral mucositis* akibat kemoterapi. Pemenuhan rasa nyaman yang baik pada semua aspek dengan tingkatan *relief* hingga *transcendence* akan mendorong penurunan lama hari rawat anak, penurunan kebutuhan akan tindakan medis dan peningkatan kepuasan anak dan keluarga.

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa dengan penambahan penggunaan *Cryotherapy* dapat meningkatkan percepatan pemulihan dan juga dapat mencegah dari terjadinya *oral mucositis* pada anak leukemia dengan tindakan kemoterapy.

SARAN

Bagi Institusi RS, Sesuai dari kesimpulan di atas bahwa pemberian *Cryoterapy* dan *oral care* standar RS berpengaruh untuk menurunkan derajat *oral mucositis*, sehingga penelitian ini dapat di terapkan sebagai implementasi keperawatan di RS, adapun pihak RS dapat berkerjasama dengan bagian Gizi untuk menyediakan es keping sebelum, sesaat dan setelah dilakukan kemoterapi pada anak.

Bagi Pendidikan Keperawatan, Ilmu keperawatan dapat berkembang lebih jauh lagi disesuaikan dengan perkembangan penelitian

diindustri 4.0, sehingga mampu menyesuaikan dengan zaman yang moderen

Bagi Peneliti Selanjutnya, Mengembangkan penelitian dari *cryoterapy* dengan memvariasikan berbagai model dan rasa untuk anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alligood, M. R., & Tomey, A. N. (2014). *Nursingtheory. Utilization & application*. Edition, ST. Louis : Mosby elsevier, Inc
- Bowden, V. R., Greenberg, C. S., & Donaldson, N. E. (2010). *Children and Their Families*. (2nd ed). China: Lippincot Williams & Wilkins
- Cawley, M. M., & Benson L.M. (2005). *Current trends in managing oral mucositis*. Clin J Oncol Nurs. 9(5), 584-592.
- Ceng & yuen. (2014). *Factor influencing comfort level in head and neck neoplasm patients receiving radiotherapy*, international jurnal of nurseing since, sciencedirect. 394-399
- Darma Kusuma, K. (2015). *Metodelogi penelitian keperawatanp panduan melaksanakan dan menerapkan hasil penelitian*. Jakarta:TIM
- Desen, wan Penerjemah: Japaries Willie. (2011). *Buku ajar onkologi klinis. Edisi 2*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Fitria laelatul, (2018). Gambaran gejala awal anak dengan limfositik akut di Rsud dr.Moewardi Jogjakarta, Skripsi program studi keperawatan fak. Muhammadiyah Surakarta.
- Gibson, F. S. (2008). *Cancer in children and young people*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Heydari, Abbas., Hassan Sharifi, Roham Salek. (2012). “Effect of oral cryotehrapy on combination chemotherapy -iduced Oral mucositis: A Randomized Clinical Trial”. *Middle East Journal Of Cancer* 2012;3 (2&3);55-64. [internet] Diambil di <http://search.ebscohost.com/>
- Hockenberry, M. J. (2013). *Wong’s Essentials of Pediatric Nursing* (9 th Ed). St. Louis: Mosby Elsevier.
- Juniman, T. P. (2018, Oktober 13). WHO kanker membunuh hampir 10 juta orang di dunia tahun ini. hal. <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180913133914-255-329910/who->

- kanker-membunuh-hampir-10-juta-orang-di-dunia-tahun-ini.
- Kemenkes infodatin, Pusat data dan informasi Stop Kanker, (2015) <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-kanker.pdf>
- Kemenkes. (2015, Desember). Kementerian dan kesehatan ajak masyarakat cegah dan kendalikan kanker. hal. (<http://www.depkes.go.id/article/print/17020200002/kementerian-kesehatan-ajak-masyarakat-cegah-dan-kendalikan-kanker.html>).
- Mulatsih, S., Astuti, S., & Purwantika, Y. (2008). "Kejadian dan Tata Laksana Mukositis pada Pasien". *Sari Pediatri, Vol. 10, No. 4*, [internet] diambil di <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/viewFile/652/587>.
- National Cancer Institute. (2010). "Surveillance, epidemiology and end result (SEER)". [internet] diambil di www.seer.cancer.gov/cancer/incidence.html.
- nuraeni. (Maret 2013). Skor mukositis pada anak dengan kanker yang menjalani kemoterapi di RSUP dr. Hasan Sadkin. *Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing), Volume 8, No.1*.
- Riskesdas. (2013, Agustus). Kementerian Kesehatan Ajak Masyarakat Cegah Dan Kendalikan Kanker., hal. (<http://www.depkes.go.id/article/print/17020200002/kementerian-kesehatan-ajak-masyarakat-cegah-dan-kendalikan-kanker.html>).